

주기 경계조건을 갖는 고유값 문제

Fourier 급수의 기저가 나오는 이유

공학수학 II · 강의노트 §11.5 Example 풀이

1 문제

$y'' + \lambda y = 0$, $y(-L) = y(L)$, $y'(-L) = y'(L)$ 의 고유함수가

$$\left\{ 1, \cos \frac{\pi}{L}x, \cos \frac{2\pi}{L}x, \dots, \sin \frac{\pi}{L}x, \sin \frac{2\pi}{L}x, \dots \right\} \quad (1.1)$$

임을 보이고, 이 집합이 $[-L, L]$ 에서 직교함을 확인한다.

2 풀이

$\lambda = -k^2 < 0$. $y = A \cosh kx + B \sinh kx$. $y(L) - y(-L) = 2B \sinh kL = 0 \Rightarrow B = 0$, $y'(L) - y'(-L) = 2Ak \sinh kL = 0 \Rightarrow A = 0$. 자명해뿐이다.

$\lambda = 0$. $y = A + Bx$. $y(L) - y(-L) = 2BL = 0 \Rightarrow B = 0$ 이고, $y' = 0$ 이므로 두 번째 조건은 저절로 만족한다. 따라서 $\lambda_0 = 0$ 은 고유값이고 고유함수는 상수 1이다.

$\lambda = k^2 > 0$. $y = A \cos kx + B \sin kx$. 코사인은 짝함수, 사인은 기함수이므로

$$y(L) - y(-L) = 2B \sin kL = 0, \quad y'(L) - y'(-L) = -2Ak \sin kL = 0. \quad (2.1)$$

$\sin kL \neq 0$ 이면 $A = B = 0$ 이므로, 비자명해가 있으려면 $\sin kL = 0$, 즉 $k = n\pi/L$ ($n = 1, 2, \dots$)이다. 이때 두 조건이 A, B 와 관계없이 성립하므로 A 와 B 를 모두 자유롭게 고를 수 있다.

최종 해

$$\lambda_0 = 0 : y_0 = 1; \quad \lambda_n = \left(\frac{n\pi}{L}\right)^2 : y_n = A_n \cos \frac{n\pi x}{L} + B_n \sin \frac{n\pi x}{L} \quad (n = 1, 2, \dots) \quad (2.2)$$

따라서 고유함수 집합은 $\{1, \cos \frac{n\pi x}{L}, \sin \frac{n\pi x}{L}\}_{n \geq 1}$ 이다.

3 직교성

§11.5의 증명에서 경계항은 $r(b)[y_m y'_n - y_n y'_m]_b - r(a)[y_m y'_n - y_n y'_m]_a$ 이다. 이 문제에서는 $r = 1$ 이고, 주기 조건 $y(-L) = y(L)$, $y'(-L) = y'(L)$ 에 의해 두 경계항이 같으므로 상쇄된다(특히 Sturm–Liouville 문제의 경우 4). 따라서 서로 다른 고유값의 고유함수는 직교한다. 같은 고유값에 속하는 $\cos \frac{n\pi x}{L}$ 과 $\sin \frac{n\pi x}{L}$ 은 짝함수와 기함수의 곱이므로 $\int_{-L}^L \cos \frac{n\pi x}{L} \sin \frac{n\pi x}{L} dx = 0$ 이다. 결국 전체 집합이 $[-L, L]$ 에서 직교하고, 이것이 Fourier 급수의 기저이다(그림 1).

비고. 정칙 Sturm–Liouville 문제에서는 각 고유값에 고유함수가 하나뿐이다(§11.5의 성질 2). 그러나 주기 경계조건은 두 끝점의 값을 서로 연결하는 조건이어서 분리형(separated) 조건이 아니므로 그 정리가 적용되지 않는다. 실제로 $\lambda_n > 0$ 마다 독립인 고유함수가 두 개(cos, sin) 있다.




그림 1: $n = 0, \dots, 3$ 의 고유함수 ($L = 1$). 모두 $x = \pm L$ 에서 값과 기울기가 같다.