

1계 선형 방정식

표준형 $y' + P(x)y = f(x)$ 와 적분인자 $e^{\int P dx}$

공학수학 I · 강의노트 §2.3 Example 풀이

모든 풀이의 순서는 같다. (i) 표준형으로 고친다. (ii) 적분인자 $I(x) = e^{\int P(x)dx}$ 를 곱해 좌변을 $\frac{d}{dx}[Iy]$ 로 만든다. (iii) 양변을 적분한다. 해가 정의되는 구간은 표준형의 P 와 f 가 연속인 구간이다.

1 일반해

(1) $y' + 2y = 0$. $I = e^{2x}$ 이고 $(e^{2x}y)' = 0$ 이므로

답

$$y = ce^{-2x}, \quad -\infty < x < \infty$$

(2) $y' + 2xy = x^3$. $I = e^{x^2}$ 이므로 $(e^{x^2}y)' = x^3e^{x^2}$. $u = x^2$ 로 치환하면 $\int x^3e^{x^2}dx = \frac{1}{2} \int ue^u du = \frac{1}{2}(x^2 - 1)e^{x^2}$.

답

$$y = \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2} + ce^{-x^2}, \quad -\infty < x < \infty$$

(3) $xy' + 2y = 3$. 표준형 $y' + \frac{2}{x}y = \frac{3}{x}$, $I = e^{2\ln|x|} = x^2$ 이므로 $(x^2y)' = 3x$, $x^2y = \frac{3}{2}x^2 + c$.

답

$$y = \frac{3}{2} + \frac{c}{x^2}, \quad 0 < x < \infty \text{ (또는 } -\infty < x < 0)$$

(4) $xy' + (1+x)y = e^{-x} \sin 2x$. 표준형 $y' + (\frac{1}{x} + 1)y = \frac{e^{-x} \sin 2x}{x}$, $I = e^{\ln x + x} = xe^x$ ($x > 0$).

$$(xe^xy)' = \sin 2x \Rightarrow xe^xy = -\frac{1}{2} \cos 2x + c.$$

답

$$y = \frac{e^{-x}}{x} \left(c - \frac{1}{2} \cos 2x \right), \quad 0 < x < \infty$$

2 초기값 문제와 해의 최대 구간

(1) $y \frac{dx}{dy} - x = 2y^2$, $y(1) = 5$. y 를 독립변수, x 를 종속변수로 보면 x 에 대해 선형이다. 표준형 $\frac{dx}{dy} - \frac{1}{y}x = 2y$, $I = e^{-\ln y} = \frac{1}{y}$:

$$\frac{d}{dy} \left[\frac{x}{y} \right] = 2 \Rightarrow \frac{x}{y} = 2y + c \Rightarrow x = 2y^2 + cy.$$

$y(1) = 5$ 는 $x = 1$ 일 때 $y = 5$ 라는 뜻이므로 $1 = 50 + 5c$, $c = -\frac{49}{5}$.

답

$$x = 2y^2 - \frac{49}{5}y, \quad 0 < y < \infty$$

표준형의 계수 $-1/y$ 가 $y = 0$ 에서 불연속이고 초기점이 $y = 5 > 0$ 이므로 구간은 $y > 0$ 이다.

(2) $(x+1)\frac{dy}{dx} + y = \ln x$, $y(1) = 10$. 좌변이 이미 $\frac{d}{dx}[(x+1)y]$ 이다.

$$(x+1)y = \int \ln x \, dx = x \ln x - x + c.$$

$$x=1: 2 \cdot 10 = -1 + c, c = 21.$$

답

$$y = \frac{x \ln x - x + 21}{x+1}, \quad 0 < x < \infty$$

$\ln x$ 때문에 $x > 0$ 이어야 하고, $x = -1$ 은 그 바깥이므로 구간은 $(0, \infty)$ 이다.

3 y 에 대해서는 비선형이지만 x 에 대해서는 선형인 방정식

x 를 y 의 함수로 보면 $\frac{dx}{dy} + P(y)x = f(y)$ 꼴의 선형 방정식이 된다.

(1) $dx = (x + y^2)dy: \frac{dx}{dy} - x = y^2, I = e^{-y}$.

$$(e^{-y}x)' = y^2 e^{-y} \Rightarrow e^{-y}x = -(y^2 + 2y + 2)e^{-y} + c.$$

답

$$x = -y^2 - 2y - 2 + ce^y$$

(2) $y \, dx + (2x + xy - 3)dy = 0: \frac{dx}{dy} + \left(1 + \frac{2}{y}\right)x = \frac{3}{y}, I = e^{y+2\ln y} = y^2 e^y$.

$$(y^2 e^y x)' = 3y e^y \Rightarrow y^2 e^y x = 3(y-1)e^y + c.$$

답

$$x = \frac{3}{y} - \frac{3}{y^2} + \frac{c}{y^2} e^{-y}$$

(노트 Worked Exercise 8에 완전미분방정식으로 푸는 방법도 있다.)

4 사인 적분 함수로 나타내기

$x^3 y' + 2x^2 y = 10 \sin x$, $y(1) = 0$. 양변을 x 로 나누면 좌변이 곧 $\frac{d}{dx}[x^2 y]$ 이다:

$$\frac{d}{dx}[x^2 y] = \frac{10 \sin x}{x}.$$

1부터 x 까지 적분하면 ($y(1) = 0$ 이므로 좌변의 아래끝 값은 0)

$$x^2 y = 10 \int_1^x \frac{\sin t}{t} dt = 10 [\text{Si}(x) - \text{Si}(1)].$$

답

$$y = \frac{10}{x^2} [\text{Si}(x) - \text{Si}(1)], \quad 0 < x < \infty$$

비고. $\sin t/t$ 는 초등함수인 역도함수가 없으므로, 이런 적분은 정적분으로 정의된 함수 Si로 답을 쓴다. $\text{Si}(1) \approx 0.9461$.