

상수계수 제차 선형 방정식

특성방정식의 근으로 일반해 쓰기

공학수학 I · 강의노트 §3.3 Example 풀이

1 $y'' + \omega^2 y = 0$ 과 $y'' - \omega^2 y = 0$ ($\omega > 0$)

- $y'' + \omega^2 y = 0$: $p^2 + \omega^2 = 0$, $p = \pm i\omega$ (Case III, $\alpha = 0$, $\beta = \omega$).
- $y'' - \omega^2 y = 0$: $p^2 - \omega^2 = 0$, $p = \pm \omega$ (Case I).

답

$$y'' + \omega^2 y = 0: y = c_1 \cos \omega x + c_2 \sin \omega x$$

$$y'' - \omega^2 y = 0: y = c_1 e^{\omega x} + c_2 e^{-\omega x} = C_1 \cosh \omega x + C_2 \sinh \omega x$$

2 $3y''' + 5y'' + 10y' - 4y = 0$

특성방정식 $3p^3 + 5p^2 + 10p - 4 = 0$. 유리근 후보 중 $p = \frac{1}{3}$ 이 근이다 ($\frac{1}{9} + \frac{5}{9} + \frac{10}{3} - 4 = 0$). 인수분해하면

$$(3p - 1)(p^2 + 2p + 4) = 0 \Rightarrow p = \frac{1}{3}, \quad p = -1 \pm \sqrt{3}i.$$

답

$$y = c_1 e^{x/3} + e^{-x} (c_2 \cos \sqrt{3}x + c_3 \sin \sqrt{3}x)$$

3 2계 방정식의 일반해

$$(1) \quad 4y'' + y' = 0: 4p^2 + p = p(4p + 1) = 0, p = 0, -\frac{1}{4}. \quad y = c_1 + c_2 e^{-x/4}$$

$$(2) \quad y'' - y' - 6y = 0: (p - 3)(p + 2) = 0. \quad y = c_1 e^{3x} + c_2 e^{-2x}$$

$$(3) \quad y'' + 8y' + 16y = 0: (p + 4)^2 = 0 \text{ (중근)}. \quad y = (c_1 + c_2 x)e^{-4x}$$

4 고계 방정식의 일반해

$$(1) \quad y''' - 4y'' - 5y' = 0: p(p^2 - 4p - 5) = p(p - 5)(p + 1) = 0. \quad y = c_1 + c_2 e^{5x} + c_3 e^{-x}$$

$$(2) \quad y''' - 5y'' + 3y' + 9y = 0: p = -1 \text{ 이 근이므로 } (p + 1)(p^2 - 6p + 9) = (p + 1)(p - 3)^2 = 0. \\ y = c_1 e^{-x} + (c_2 + c_3 x)e^{3x}$$

5 초기값 문제: $y''' + 12y'' + 36y' = 0$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$, $y''(0) = -7$

$$p(p + 6)^2 = 0 \text{ 이므로 } y = c_1 + (c_2 + c_3 x)e^{-6x}.$$

$$\begin{aligned} y' &= (c_3 - 6c_2 - 6c_3 x)e^{-6x}, & y'' &= (-12c_3 + 36c_2 + 36c_3 x)e^{-6x}, \\ y(0) &= c_1 + c_2 = 0, & y'(0) &= c_3 - 6c_2 = 1, & y''(0) &= 36c_2 - 12c_3 = -7. \end{aligned}$$

둘째·셋째 식에서 $c_2 = -\frac{5}{36}$, $c_3 = \frac{1}{6}$, 첫째 식에서 $c_1 = \frac{5}{36}$.

답

$$y = \frac{5}{36} - \frac{5}{36}e^{-6x} + \frac{1}{6}xe^{-6x}$$