

행렬의 계수(rank)

계수, 일차독립, 해의 매개변수 개수

공학수학 I · 강의노트 §6.3 Example 풀이

1 계수 구하기

행사다리꼴로 바꾼 뒤 0이 아닌 행의 수를 센다.

(1) $\begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 6 & 3 & 9 \\ -1 & -\frac{1}{2} & -\frac{3}{2} \end{pmatrix}$: 둘째 행은 첫째 행의 3배, 셋째 행은 $-\frac{1}{2}$ 배이다. 행사다리꼴 $\begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{3}{2} \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. **rank** = 1.

(2) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 4 \\ 1 & 4 & 1 \end{pmatrix}$: $\det = 1(0 - 16) - 1(1 - 4) + 1(4 - 0) = -9 \neq 0$ 이므로 세 행이 일차독립이다. **rank** = 3.

(3) $\begin{pmatrix} 0 & 2 & 4 & 2 & 2 \\ 4 & 1 & 0 & 5 & 1 \\ 2 & 1 & \frac{2}{3} & 3 & \frac{1}{3} \\ 6 & 6 & 6 & 12 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. **rank** = 3. (rank가 3이므로 넷째 행은 나머지 세 행의 일차결합이다.)

2 벡터의 일차독립 판정

벡터들을 행으로 쌓은 행렬의 계수가 벡터의 개수와 같으면 일차독립이다.

(1) $\mathbf{u}_1 = \langle 1, 2, 3 \rangle$, $\mathbf{u}_2 = \langle 1, 0, 1 \rangle$, $\mathbf{u}_3 = \langle 1, -1, 5 \rangle$: $\det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 5 \end{pmatrix} = 1(0 + 1) - 2(5 - 1) + 3(-1 - 0) = -10 \neq 0$. **rank** = 3이므로 일차독립.

(2) $\mathbf{u}_1 = \langle 1, -1, 3, -1 \rangle$, $\mathbf{u}_2 = \langle 1, -1, 4, 2 \rangle$, $\mathbf{u}_3 = \langle 1, -1, 5, 7 \rangle$:

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 & -1 \\ 1 & -1 & 4 & 2 \\ 1 & -1 & 5 & 7 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{-R_1+R_2 \\ -R_1+R_3}} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & 8 \end{pmatrix} \xrightarrow{-2R_2+R_3} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

rank = 3이므로 일차독립이다.

3 해의 매개변수 개수

문제. $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ 가 해를 갖고, $\mathbf{A}$ 는 5×8 , **rank** $\mathbf{A} = 3$ 이다.

풀이. 해를 가지는(consistent) 연립방정식에서 매개변수의 개수는 (미지수의 수) - (계수) = $n - r$ 이다. 미지수는 8개이므로

답

매개변수는 $8 - 3 = 5$ 개이다.

4 4×6 행렬에 관한 질문

$\mathbf{A}$ 는 영행렬이 아닌 4×6 행렬이다.

1. rank는 행의 수와 열의 수 중 작은 값을 넘지 못하므로 최대 rank는 4이다.
2. 해가 있을 필요충분조건은 $\text{rank}(\mathbf{A}) = \text{rank}(\mathbf{A}|\mathbf{b})$ 이다. $\text{rank}(\mathbf{A}|\mathbf{b}) = 2$ 이고 $\text{rank}(\mathbf{A}) \leq \text{rank}(\mathbf{A}|\mathbf{b})$ 이며 $\mathbf{A} \neq \mathbf{0}$ 이므로 $\text{rank}(\mathbf{A}) \in \{1, 2\}$ 이다. $\text{rank}(\mathbf{A}) = 1$ 이면 해가 없고(inconsistent), $\text{rank}(\mathbf{A}) = 2$ 이면 해가 있다(consistent; 이때 매개변수는 $6 - 2 = 4$ 개).
3. 동차 연립방정식 $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$ 은 항상 해를 가진다. $\text{rank}(\mathbf{A}) = 3$ 이면 매개변수는 $6 - 3 = 3$ 개이다.

5 열벡터의 일차관계로부터 계수 추론

풀이. $2\mathbf{v}_1 + 3\mathbf{v}_2 - \mathbf{v}_3 = \mathbf{0}$ 은 세 열벡터가 일차종속이라는 뜻이다. 따라서 일차독립인 열은 최대 2개이고 $\text{rank}(\mathbf{A}) \leq 2$ 이다. 또 $\mathbf{v}_1 = \langle 2, 1, -1 \rangle$ 과 $\mathbf{v}_2 = \langle 1, 0, 5 \rangle$ 은 서로 상수배가 아니므로 일차독립이다.

답

$\text{rank}(\mathbf{A}) = 2$ (따라서 $\det \mathbf{A} = 0$).

비고. 행의 계수(최대 일차독립 행의 수)와 열의 계수(최대 일차독립 열의 수)는 항상 같다. 그래서 열벡터의 관계로 rank를 판단할 수 있다.