

# b에서 a 방향 성분을 뺀 벡터

정사영과 직교 분해

공학수학 II · 강의노트 §9.3 Example 풀이

## 1 문제

$\mathbf{a} \neq \mathbf{0}$ 일 때 벡터

$$\mathbf{c} = \mathbf{b} - \left( \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{\mathbf{a} \cdot \mathbf{a}} \right) \mathbf{a}$$

가  $\mathbf{a}$ 와 직교함을 보인다.

## 2 풀이

두 벡터가 직교할 필요충분조건은 내적이 0인 것이다. 내적의 선형성( $\mathbf{a} \cdot (\mathbf{u} + k\mathbf{v}) = \mathbf{a} \cdot \mathbf{u} + k\mathbf{a} \cdot \mathbf{v}$ )을 쓰면

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{c} = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} - \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{\mathbf{a} \cdot \mathbf{a}} (\mathbf{a} \cdot \mathbf{a}) = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} - \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0.$$

여기서  $\mathbf{a} \neq \mathbf{0}$ 이므로  $\mathbf{a} \cdot \mathbf{a} = \|\mathbf{a}\|^2 > 0$ 이고 나눗셈이 가능하다.

### 결론

$\mathbf{a} \cdot \mathbf{c} = 0$ 이므로  $\mathbf{c} \perp \mathbf{a}$ 이다. (또  $\mathbf{c} = \mathbf{0}$ 인 경우, 즉  $\mathbf{b}$ 가  $\mathbf{a}$ 에 평행한 경우에도 영벡터는 모든 벡터와 직교한다고 본다.)

## 3 기하학적 의미

$\text{proj}_{\mathbf{a}} \mathbf{b} = \left( \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{\mathbf{a} \cdot \mathbf{a}} \right) \mathbf{a}$ 는  $\mathbf{b}$ 를  $\mathbf{a}$  위에 내린 정사영이다. 따라서

$$\mathbf{b} = \underbrace{\text{proj}_{\mathbf{a}} \mathbf{b}}_{\mathbf{a} \text{에 평행}} + \underbrace{\mathbf{c}}_{\mathbf{a} \text{에 수직}}$$

는  $\mathbf{b}$ 를  $\mathbf{a}$ 에 평행한 성분과 수직인 성분으로 나눈 직교 분해이다(그림 1).

수치 예.  $\mathbf{a} = \langle 1, 2, 2 \rangle$ ,  $\mathbf{b} = \langle 3, 0, 4 \rangle$  이면  $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 11$ ,  $\mathbf{a} \cdot \mathbf{a} = 9$ 이고

$$\mathbf{c} = \langle 3, 0, 4 \rangle - \frac{11}{9} \langle 1, 2, 2 \rangle = \frac{1}{9} \langle 16, -22, 14 \rangle, \quad \mathbf{a} \cdot \mathbf{c} = \frac{1}{9} (16 - 44 + 28) = 0.$$

비고. 이 계산이 §9.7 Gram-Schmidt 과정의 한 단계이다:  $\mathbf{v}_2 = \mathbf{u}_2 - \frac{\mathbf{u}_2 \cdot \mathbf{v}_1}{\mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_1} \mathbf{v}_1$  은 바로 위의  $\mathbf{c}$ 이다.




그림 1:  $\mathbf{b} = \text{proj}_{\mathbf{a}} \mathbf{b} + \mathbf{c}$ ,  $\mathbf{c} \perp \mathbf{a}$ .