

두 평면의 교선

법선벡터의 벡터곱이 교선의 방향

공학수학 II · 강의노트 §9.5 Example 풀이

1 문제

두 평면 $5x - 4y - 9z = 8$, $x + 4y + 3z = 4$ 의 교선의 매개변수 방정식을 구한다.

2 풀이

2.1 방향벡터

교선은 두 평면에 모두 놓이므로 두 법선벡터 $\mathbf{n}_1 = \langle 5, -4, -9 \rangle$, $\mathbf{n}_2 = \langle 1, 4, 3 \rangle$ 에 모두 수직이다. 따라서 방향벡터로 $\mathbf{n}_1 \times \mathbf{n}_2$ 를 쓸 수 있다.

$$\mathbf{n}_1 \times \mathbf{n}_2 = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 5 & -4 & -9 \\ 1 & 4 & 3 \end{vmatrix} = ((-4)(3) - (-9)(4))\mathbf{i} - (5 \cdot 3 - (-9) \cdot 1)\mathbf{j} + (5 \cdot 4 - (-4) \cdot 1)\mathbf{k} = \langle 24, -24, 24 \rangle.$$

간단히 $\mathbf{v} = \langle 1, -1, 1 \rangle$ 로 쓴다.

2.2 교선 위의 한 점

$\mathbf{v}$ 의 z 성분이 0이 아니므로 교선은 평면 $z = 0$ 과 만난다. $z = 0$ 을 넣으면

$$5x - 4y = 8, \quad x + 4y = 4 \implies 6x = 12, \quad x = 2, \quad y = \frac{1}{2}.$$

점 $(2, \frac{1}{2}, 0)$ 은 두 평면 위에 있다: $5(2) - 4(\frac{1}{2}) = 8$, $2 + 4(\frac{1}{2}) = 4$.

답

$$x = 2 + t, \quad y = \frac{1}{2} - t, \quad z = t, \quad -\infty < t < \infty.$$

3 확인

식을 두 평면에 직접 넣으면 t 가 소거된다.

$$5(2+t) - 4(\frac{1}{2}-t) - 9t = 8 + (5+4-9)t = 8, \quad (2+t) + 4(\frac{1}{2}-t) + 3t = 4 + (1-4+3)t = 4.$$

다른 방법 (소거법). $z = t$ 로 두고 두 식을 x, y 에 대해 풀어도 된다. 두 식을 더하면 $6x - 6z = 12$, 즉 $x = 2 + t$. 둘째 식에 넣으면 $4y = 4 - x - 3z = 2 - 4t$, 즉 $y = \frac{1}{2} - t$ 로 같은 결과를 얻는다.

비고. 매개변수 표현은 하나로 정해지지 않는다. 다른 점(예: $t = -2$ 일 때 $(0, \frac{5}{2}, -2)$)이나 방향벡터 $\langle 24, -24, 24 \rangle$ 를 써도 같은 직선이다.




그림 1: 두 평면과 교선(빨강).