

주어진 직선을 포함하고 다른 평면에 수직인 평면

두 방향에 수직인 법선벡터 = 벡터곱

공학수학 II · 강의노트 §9.5 Example 풀이

1 문제

직선 $\frac{2-x}{3} = \frac{y+2}{5} = \frac{z-8}{2}$ 을 포함하고 평면 $2x - 4y - z + 16 = 0$ 에 수직인 평면의 방정식을 구한다.

2 풀이

2.1 직선의 점과 방향

대칭방정식을 표준형 $\frac{x-x_0}{a} = \frac{y-y_0}{b} = \frac{z-z_0}{c}$ 로 맞춘다. $\frac{2-x}{3} = \frac{x-2}{-3}$ 이므로 직선은 점 $P_0(2, -2, 8)$ 을 지나고 방향벡터는

$$\mathbf{d} = \langle -3, 5, 2 \rangle$$

이다. (부호에 주의: x 의 계수가 -1 이므로 방향벡터의 x 성분은 $+3$ 이 아니라 -3 이다.)

2.2 구하는 평면의 법선벡터

구하는 평면을 Π , 그 법선벡터를 $\mathbf{n}$ 이라 하자.

- Π 가 직선을 포함하므로 $\mathbf{n} \perp \mathbf{d}$.
- Π 가 평면 $2x - 4y - z + 16 = 0$ 에 수직이므로, 그 평면의 법선 $\mathbf{m} = \langle 2, -4, -1 \rangle$ 은 Π 에 평행하다. 따라서 $\mathbf{n} \perp \mathbf{m}$.

그러므로

$$\mathbf{n} = \mathbf{d} \times \mathbf{m} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ -3 & 5 & 2 \\ 2 & -4 & -1 \end{vmatrix} = (5(-1) - 2(-4))\mathbf{i} - ((-3)(-1) - 2 \cdot 2)\mathbf{j} + ((-3)(-4) - 5 \cdot 2)\mathbf{k} = \langle 3, 1, 2 \rangle.$$

2.3 평면의 방정식

$\mathbf{n} \cdot (\mathbf{r} - \mathbf{r}_0) = 0$ 에 $P_0(2, -2, 8)$ 을 넣으면

$$3(x-2) + (y+2) + 2(z-8) = 0.$$

답

$$3x + y + 2z = 20$$

3 확인

- 직선 위의 점 $x = 2 - 3t, y = -2 + 5t, z = 8 + 2t$ 를 넣으면 $3(2-3t) + (-2+5t) + 2(8+2t) = 20 + 0 \cdot t = 20$. 직선 전체가 평면 위에 있다.
- 두 평면의 법선이 수직: $\langle 3, 1, 2 \rangle \cdot \langle 2, -4, -1 \rangle = 6 - 4 - 2 = 0$.

비고. “평면 Π_1 이 평면 Π_2 에 수직”이라는 조건은 두 법선벡터가 서로 수직이라는 뜻이다. 법선벡터가 평행하다는 뜻(그러면 두 평면은 평행)과 혼동하지 않도록 주의한다.